

### **Kwaliteit graskuilen 2009.**

*De eerste uitslagen van de graskuilen komen binnen. Met name de (te) snelle verteerbaarheid valt op. Bij deze een aantal aandachtspunten.*

De eerste snede gras is dit voorjaar op een aantal plekken zeer vroeg gemaaid. Voornamelijk de kuilen van eind april en de eerste dagen van mei zijn droog, hebben een zeer hoge VEM en bevatten een zeer hoog suikergehalte. Deze kuilen vallen op door een ontzettend lage ruwe celstof en ADL. ADL is Engelse afkorting van "Acid Detergen Lignin" en zegt iets over het aandeel onverteerbare houtstof in de ruwe celstof. Hoe lager de ADL, hoe hoger de verteerbaarheid. Hierin schuilt echter ook een gevaar. Omdat de koe een herkauwer is moet er altijd een minimum hoeveelheid "moeilijk verteerbare ruwe celstof" om de pens optimaal te laten werken. Bij een zeer lage ADL in graskuil (< 22-23) komen structuurproblemen in de pens eerder voor. Bij met name deze zeer vroege kuilen zal dit het geval zijn. Zelfs bij de kuilen gemaaid vanaf 10 mei zien we nog dat deze kuilen gevaarlijk snel kunnen zijn en zullen er maatregelen moeten worden genomen. Niet alleen het bijvoeren van (graszaad)stro en gehakseld koolzaadstro behoren tot de mogelijkheden, maar ook zullen selectief krachtvoergrondstoffen of bijproducten met méér ruwe celstof moeten worden ingezet. Hierbij moet u denken aan sojahuilen, bietenpulp, bierbostel etc. Verderop in deze nieuwsbrief worden 2 nieuwe krachtvoerders geïntroduceerd, passend naast deze snelle graskuilen. Ons advies is om het gras niet te vroeg te maaien. Dit gaat ten koste van de penswerking en de gezondheid van de koe. Pensverzuring, klauwproblemen en een minder goede opname van allerlei voedingsstoffen (o.a. vitamines en mineralen) zullen het gevolg zijn. Nieuw is verder dat op de kuiluitslagen van het BLGG een broeigevoeligheidsindex (op de schaal van 0-100) wordt weergegeven. Hierbij wordt een inschatting gegeven van de broeikansen na opening van de kuil. Met deze informatie kan worden overwogen welke kuil het beste in de zomer kan worden gevoerd en of er eventueel nog TMR-broeiremmers in de voermengwagen moet worden gebruikt.

Het streefgetal van het suikergehalte op uw verslag is aangepast aan het DS-gehalte van

de kuil. In het algemeen is het zo dat de streefwaarde van het suikergehalte bij een droge kuil hoger moet/mag zijn bij een natte graskuil. Met deze aangepaste streefwaarde is een betere inschatting te maken of een suikergehalte te laag of te hoog is.

### **Assortiment melkveevoeders.**

*Het assortiment melkveevoeders wordt met twee in het oog springende krachtvoerders uitgebreid.*

De zeer goede graskuilen die dit voorjaar zijn aangelegd kunnen een prima basis zijn voor een lage kostprijs van de melk. Omdat de VEM van de kuilen hoog is en de ruwe celstof in veel gevallen (te) laag, kunnen krachtvoerders met een hoog aandeel goed verteerbare ruwe celstof tegenwicht geven. Gezien het hoge suikergehalte van genoemde graskuilen zullen deze krachtvoerders niet te snel verteerbaar mogen zijn. Deze goed uitgebalanceerde melkveevoeders worden, net als onze andere voeders, tegen *scherpe prijzen* aangeboden. Iets wat, zeker bij de huidige melkprijs goed past. De assortimentsuitbreiding bestaat uit de **Perfect Basisbrok** (3001) met 17 % Ruw Eiwit en de **Perfect Eiwitbrok** (3046) met 32% Ruw Eiwit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw voorlichter van Booijink Veevoeders.

### **Mineralen roséveleskalveren.**

*Groepen kalveren die moeilijk opstarten zullen tijdelijk met mineralen moeten worden ondersteund. Hiervoor hebben we nu een nieuw product in ons assortiment.*

Door de sterk verschillende herkomst van kalveren zullen er altijd (groepen) dieren zijn die minder goed opstarten. Vooral na het afspenen, tot een leeftijd van ongeveer 14 weken, zijn er kalveren die moeite hebben met de overgang van melk naar vast voer. Met name indien de dieren tijdelijk onvoldoende ruwvoer opnemen, ligt verzuring op de loer. Op dat moment is het belangrijk om deze dieren met extra vitamines, mineralen en bufferende stoffen te ondersteunen. Hiervoor hebben we vanaf heden **Ruprobeef Fit** (8806) van Provimi in het pakket. Dit aanvullende mineraal moet in een hoeveelheid van 50 tot 100 gram per dier per dag bij geschetste omstandigheden worden bijgevoerd.

### **Juiste voeding dekseizoen bij Ooien.**

*Het dekseizoen van ooien staat weer voor de deur. Neem voedingstechnisch de juiste maatregelen om het dekseizoen tot een succes te maken.*

Een juiste (extra) voeding tijdens het dekseizoen van ooien is van invloed op het aantal lammeren dat wordt geboren. In de volkmond wordt dit aangeduid met het begrip "flushing". Afhankelijk van de conditie van de ooien zal ongeveer 6 weken vóór het toelaten van de rammen moeten worden begonnen met "flushen". Een goed aanbod van weidegras en een extra krachtvoergift van 100 – 200 gram schapenbrok in die periode is van groot belang. Als niet bekend is of de mineralenvoorziening van de grond goed op peil is, kan in deze periode het best een groene mineralenemmer (Rupromin Sheep) in het land worden gezet. Zeker op zandgrond is dit aan te bevelen. De extra mineralen zorgen voor sterkere klauwen en minder kreupelheid, vlotter aflammeren en gezondere en vitalere lammeren. Mochten de dieren in overmatige conditie zijn, dan is bijvoeding minder belangrijk. Zorg er echter wel voor dat deze ooien niet afvallen in deze periode voor het dekken! Laat dieren ook niet in een te ruime conditie de dracht ingaan. Het optreden van melkziekte zal dan eerder plaats vinden. Van 1 tot 3 maand dracht is het voldoende om dieren op de onderhoudsbehoefte te voeren. Na 3 maanden dracht (we zitten dan inmiddels volop in de winter) is het bijvoeren van extra ruw- en krachtvoer belangrijk. Extra aandacht in de voeding zal zondermeer tot méér en levensvatbaardere lammeren leiden in het komende voorjaar!

### **Naamgeving Provimi biggenvoerders gewijzigd.**

*Sinds kort is de naamgeving van de Provimi biggenvoerders gewijzigd. De wijzigingen geven we hierbij weer.*

In de varkenshouderij is een groot verschil in de productie tussen bedrijven. Zelfs binnen een bedrijf kan de productie variëren, bijvoorbeeld door de gezondheidstoestand in een bepaalde periode. Dit resulteert in een verschil in het aantal gespeende biggen per worp en in een verschil in het aantal afgeleverde biggen. Deze aspecten kunnen er voor zorgen dat de voedingsbehoefte anders is en er speciale voerprogramma's nodig zijn. De voerprogramma's HeaviPig (zwarte biggen) en HealthyPig (gezonde biggen) bieden u veiligheid en de beste zorg voor de opstart van uw biggen. De

combinatie van de selectie van speciale grondstoffen, innovatieve samenstelling en speciale additieven zorgen voor de perfecte balans tussen prestatie en veiligheid. Deze combinaties worden ook gebruikt in de opvolgende speen- en opfokvoerders.

In de onderstaande tabel vindt u de gewijzigde naamgeving:

Code	Oude naam	Nieuwe naam	Vorm
1502	Provilat	<b>HealthyPig 1-2</b>	Korrel
1503	Provilat	<b>HealthyPig 1-2</b>	Meel
1510	Promote	<b>HeaviPig 1</b>	Poeder
1501	Porcipart	<b>HeaviPig 2</b>	Micrum
1507	Prorespons	<b>HeaviPig 3</b>	Micrum
6098	Rescue Milk	<b>Rescue Milk</b>	Poeder

De wijzigingen worden vanaf heden doorgevoerd. Door nog aanwezige voorraden kan het een aantal weken duren voordat alles is omgezet.

### **Biggenmelk.**

*Bij hogere staltemperaturen hebben de lacterende zeugen soms moeite om de benodigde hoeveelheid voer op te eten. Dit resulteert in een lagere melkproductie.*

Wanneer de buitentemperatuur oploopt, gaat ook de temperatuur in de varkensstal omhoog. Vooral in de kraamstal geeft dit aanleiding tot verminderde productie. De zeug gaat door de hittestress namelijk minder eten. Als zeugen hierdoor minder melk produceren is middels het verstrekken van biggenmelk een aanvulling te geven voor de biggen. Wij hebben hiervoor Rescue Milk in ons programma. Uit proeven blijkt dat de biggen die bijgevoerd worden met Rescue Milk, 60% meer voer op nemen voor spenen. Dit is natuurlijk zeer gunstig is voor de periode na spenen. Rescue Milk is lang houdbaar en kan dus via voorraadvoeding verstrekt worden. Tevens kan Rescue Milk prima gebruikt worden om de eerste dagen na het spenen over het speenvoer te strooien, om de voeropname te verbeteren.

#### Te koop gevraagd:

- Biggenweegschaal en rubber matten.

☎ W. Rensen, 06-23485438

#### Te koop aangeboden:

- 9 multiplexdeuren met hengsels

- gegalvaniseerde putrand voor melkstal

- trapje voor in een melkput

☎ mts. Kemper, tel.0572-358004 / 06-50681113

Met vriendelijke groet,  
Booijink Veevoerders